

Bienenfreundliche Pflanzen für Schatten und Halbschatten auf schwach saurem, humusreichem Gartenboden

Deutscher Name Botanischer Name	Höhe cm	Blütemonat Blütenfarbe	Bemerkung	Wildbienen und andere Bestäuber
Weißes Buschwindröschen <i>Anemone nemorosa</i> Hahnenfußgewächse	10 - 20	4 – 5 weiß	ausdauernd, krautig, Rhizom als Speicher- und Überdauerungsorgan, alle Teile der Pflanze sind giftig	Fuchsrote Sandbiene (<i>Andrena fulva</i>), Graue Sandbiene (<i>Andrena cineraria</i>), Gebänderte Furchenbiene (<i>Halictus tumulorum</i>)
Gelbes Windröschen <i>Anemone ranunculoides</i> Hahnenfußgewächse	10 - 20	4 -5 gelb	ausdauernd, krautig, alle Teile der Pflanze sind giftig, Samen wird durch Ameisen verbreitet	Fuchsrote Sandbiene (<i>Andrena fulva</i>), Graue Sandbiene (<i>Andrena cineraria</i>), Gebänderte Furchenbiene (<i>Halictus tumulorum</i>)
Gefingertes Lerchensporn <i>Corydalis solida</i> Mohngewächse	20 – 30	4 – 5 rosa	ausdauernd, krautig, es vergehen meist mehrere Jahre bis zur ersten Blüte, besitzt eine Wurzelknolle	Hummeln mit langem Rüssel, Gebänderte Furchenbiene (<i>Halictus tumulorum</i>), Furchenbiene (<i>Lasioglossum nitidulum</i>)
Hohler Lerchensporn <i>Corydalis cava</i> Mohngewächse	20 – 30	4 – 5 violett	ausdauernd, krautig, giftig, oberirdische Teile verwelken, sind im Sommer nicht mehr sichtbar	Hummeln mit langem Rüssel, Gebänderte Furchenbiene (<i>Halictus tumulorum</i>), Furchenbiene (<i>Lasioglossum nitidulum</i>)
Gelber Lerchensporn <i>Corydalis lutea</i> Mohngewächse	20 - 30	5 – 9 gelb	mehrfährig krautige Pflanze, wächst buschig, Knolle giftig	Hummeln mit langem Rüssel, Gebänderte Furchenbiene (<i>Halictus tumulorum</i>), Furchenbiene (<i>Lasioglossum nitidulum</i>)
Gemeiner Waldmeister <i>Galium odoratum</i> Rötegewächse	20 – 30	5 – 6 weiß	überwinternd grün, ausdauernd, krautig, Rhizom, bildet reichlich Ausläufer	Furchenbiene <i>Lasioglossum pauxillum</i> , Gewöhnliche Keulhornbiene (<i>Ceratina cyanea</i>); Fliegen
Kriechender Günsel <i>Ajuga reptans</i> Lippenblütengewächse	20 – 30	4 – 6 rosa	ausdauernd, krautig, Rhizom und lange Ausläufer, Heilpflanze gegen Rheuma und Magengeschwüre	Baumhummer (<i>Bombus hypnorum</i>), Erdhummer (<i>Bombus terrestris</i>), Rostrote Mauerbiene (<i>Osmia bicornis</i>), Frühlings-Trauerbiene (<i>Melecta albifrons</i>)
Gewöhnliches Leberblümchen <i>Hepatica nobilis</i> Hahnenfußgewächse	10 - 20	4 – 5 blau	überwinternd grün, ausdauernd, krautig, bildet Überdauerungsknospen an den Blattachseln aus, Tiefwurzler	Fuchsrote Sandbiene (<i>Andrena fulva</i>), Graue Sandbiene (<i>Andrena cineraria</i>), Gebänderte Furchenbiene (<i>Halictus tumulorum</i>)
Gewöhnlicher Erdrrauch <i>Fumaria officinalis</i> Mohngewächse	20 – 30	5 – 11 violett	einjährig, krautig, giftig, Samen werden durch Ameisen verbreitet	Gebänderte Furchenbiene (<i>Halictus tumulorum</i>), Furchenbiene (<i>Lasioglossum nitidulum</i>); Hummeln mit langem Rüssel

Wald-Gelbstern <i>Gagea lutea</i> Liliengewächse	10 - 20	5 – 7 gelb	ausdauernd, krautig, Zwiebel, im Sommer ist Pflanze nicht mehr sichtbar	Flaum-Sandbiene (<i>Andrena nitida</i>), Sandbiene (<i>Andrena supopaca</i>)
Gewöhnliche Goldnessel <i>Lamium galeobdolum</i> Lippenblütengewächse	30 – 40	5 – 7 gelb	ausdauernd, krautig, mittels Ausläufern bildet sie oft ausgedehnte Bestände	mehrere Mauerbienen- und Hummelarten, Wald-Pelzbiene (<i>Anthophora furcata</i>), Garten-Wollbiene (<i>Anthidium manicatum</i>)
Gefleckte Taubnessel <i>Lamium maculatum</i> Lippenblütengewächse	20 – 80	5 – 6 rosa	meist ausdauernd krautig, selten einjährig, bildet ober- und unterirdische Ausläufer, blüht bereits im ersten Jahr	mehrere Mauerbienen- und Hummelarten, Wald-Pelzbiene (<i>Anthophora furcata</i>), Frühlings-Pelzbiene (<i>Anthophora plumipes</i>), Garten-Wollbiene (<i>Anthidium manicatum</i>), Blaue Mauerbiene (<i>Osmia caerulescens</i>)
Ausdauerndes Silberblatt <i>Lunaria rediviva</i> Kreuzblütengewächse	30 - 100	5 – 7 weiß	mehrfährig, krautig, besitzt ein Rhizom, Blüten duften Nachts stark fliederartig	Fuchsrote Sandbiene (<i>Andrena fulva</i>), Aschgraue Sandbiene (<i>Andrena cineraria</i>), Schöterich-Mauerbiene (<i>Osmia brevicornis</i>); Nachtfalter
Roter Fingerhut <i>Digitalis purpurea</i> Wegerichgewächse	40 – 200	5 – 7 rot, rosa	meist zweijährig, krautig, giftig, Blüte im zweiten Jahr, Heilpflanze bei Herzschwäche	Blattschneiderbiene (<i>Megachile ligniseca</i>), Furchenbiene (<i>Lasioglossum calceatum</i>), Garten-Wollbiene (<i>Anthidium manicatum</i>); Hummeln
Wald-Erdbeere <i>Fragaria vesca</i> Rosengewächse	10 – 30	5 – 7 weiß	mehrfährig, krautig, wintergrün, kann bis zum Winterfrost Früchte tragen	Mehrere Sand-, Furchen- und Maskenbienenarten
Gewöhnlicher Gilbweiderich <i>Lysimachia vulgaris</i> Primelgewächse	30 – 50	5 – 7 gelb	ausdauernd, krautig, Tiefwurzler, lockt Bestäuber mit Öl an	Furchenbiene <i>Lasioglossum calceatum</i> , Wald-Schenkelbiene (<i>Macropis fulvipes</i>), Auen-Schenkelbiene (<i>Macropis europaea</i>); Schwebfliegen
Gemeine Waldrebe <i>Clematis vitalba</i> Hahnenfußgewächse	bis 300	5 – 7 weiß	Rankpflanze, zählt zu den Lianen, verholzende, kletternde Sprossachsen, Stämme können Armstärke erreichen	Fuchsrote Sandbiene (<i>Andrena fulva</i>), Graue Sandbiene (<i>Andrena cineraria</i>), Gebänderte Furchenbiene (<i>Halictus tumulorum</i>)
Wald-Glockenblume <i>Campanula latifolia</i> Glockenblumengewächse	60 - 120	6 – 8 blau	mehrfährig, krautig, mit kräftigem Rhizom	Zweifarbige Sandbiene (<i>Andrena bicolor</i>), Kleine Glockenblumen-Scherenbiene (<i>Chelostoma campanularum</i>), (Große) Glockenblumen-Scherenbiene (<i>Chelostoma rapunculi</i>)
Mauer-Zimbelkraut <i>Cimbalaria muralis</i> Wegerichgewächse	5 - 10	6 – 10 hellviolett	ausdauernd, krautig	Hummeln, Blattschneiderbiene <i>Megachile ligniseca</i> , Furchenbiene <i>Lasioglossum calceatum</i> , Garten-Wollbiene (<i>Anthidium manicatum</i>)